













會委編刊本博

張方

受了傷的人，常因「損傷的嚴重，而使傷員有以下症狀：脈搏先是細微而遲緩，後來就變成不規則，而快，而弱，去摸脈的時候，有時難摸到，面色青白，額上出汗，呼吸

凡遇到了重壓，如密洞塌了壓着，或關了電，如當軍中，或因中毒，如煤氣毒，或水淹了，而窒息（閉了氣）的，病人最怕受冷或移動，要施以上的急救法後，病人稍好時，再向後輸送才好。

人，如心臟還跳動，只是呼吸停了的時侯，就可以用人工呼吸法，很可能救活一些人的。不過作人工呼吸法，一定要從容不迫的作，並且要至少作半小時以上，不可隨便作一會，不耐心就走了，是不會收效的。

作人工呼吸之要點：一、把傷員的領釦，胸部及腹部的帶子，釦子解開。二、把傷員鬚裏可以阻塞呼吸的東西（如假牙，一切外物，血塊等）除去。三、把病人放在空氣流通的地方。四、把病人的頭面臥落，不要任他的口鼻，靠在地面上。



甲九圖上)

使病人伏臥在地上，把他的兩臂拉直，伸過頭部，屈他一臂，把頭伸臥的枕在上面。急救者跨在他身上，跪下，而向病人頭部，兩手平放在病人的脊下部，抵指胸內靠近脊柱。然後俯身向前，用穩定不變的壓力，壓下胸部（見圖九甲）。這樣可以把肺內空氣逐出。保持兩手的位置，放鬆壓力，身體向後，使胸膛自然恢復原狀（見圖九乙）。於此空氣就隨著進到肺裏去。像這樣動作每分鐘內十五到十八次，可以隨著急救員的呼吸來動作。不過行人呼吸，不可用力過猛，以免把肋骨骨折。

中央總衛生處門診部啓事

自十月廿三日起本部改於每星期六爲校  
衛學習日，該日停診。特此啓事。

十月廿日

(續完)



(八圖)

定起來。

凡是骨折的肢體，形狀有變化的時候，如彎曲，縮短，急救的時候，不可拉直它，或移動它，只將這一肢綁在木板上，固定它就對了，因為骨髓斷了的地方，附近有許多神經及血管，若是沒有經驗與醫學理論的人，隨便拉直它，可能無意中，斷了的骨髓尖端，切斷了附近的血管，或神經，致遭受到重大危險，或使病人變為殘廢。

這樣初步的把骨折傷員處理了以後，還是要趕快送往醫院去作進一步的治療。運輸時千萬不可叫病人震動，担架應抬穩。

受了傷的人，常因「損傷的嚴重，而使傷員有以下症狀」：脈搏是細微而遲緩，後來就變成不規則，而快，而強，去摸脈的時候，有時雖摸到，面色青白，額上出汗，呼吸吸而淺，四肢冰冷。傷員常說自己已渴。有時，病人神志不清。這種現象，就叫做休克。

遇見這種現象，就將病人的頭放低，使病人平暖，多蓋被或毯。最好送進一間有火的房裏，休息一下。給他喝熱水，最好是熱茶。如有芳香醋，可給他吃一些。這種病人最怕受冷或移動，應施以上的急救法後，病人稍好時，再向後輸送才好。

人工呼吸法

凡遇到受了重擊，如緊閉了喉嚨，或關了電，如雷擊，或因中毒，如煤氣毒，或水淹了，而窒息（閉了氣）的

人，如心臟還跳動，只是呼吸停了的時侯，就可以用人工呼吸法，很可能救活一些人的。不過作人工呼吸法，一定要從容不迫的作，並且要至少作半小時以上，不可隨便作一會，不耐心就走了，是不會收效的。

作人工呼吸之要點：一、把傷員的領釦，胸部及腹部的帶子，釦子解開。二、把傷員鬚裏可以阻塞呼吸的東西（如假牙，一切外物，血塊等）除去。三、把病人放在空氣流通的地方。四、把病人的頭面臥落，不要任他的口鼻，靠在地面上。



甲九圖上)

使病人伏臥在地上，把他的兩臂拉直，伸過頭部，屈他一臂，把頭伸臥的枕在上面。急救者跨在他身上，跪下，而向病人頭部，兩手平放在病人的脊下部，抵指胸內靠近脊柱。然後俯身向前，用穩定不變的壓力，壓下胸部（見圖九甲）。這樣可以把肺內空氣逐出。保持兩手的位置，放鬆壓力，身體向後，使胸膛自然恢復原狀（見圖九乙）。於此空氣就隨著進到肺裏去。像這樣動作每分鐘內十五到十八次，可以隨著急救員的呼吸來動作。不過行人呼吸，不可用力過猛，以免把肋骨骨折。

中央總衛生處門診部啓事

自十月廿三日起本部改於每星期六爲校  
衛學習日，該日停診。特此啓事。

十月廿日



治療。運輸時千萬不可叫病人震動，担架應抬穩。



(八圖)

伯庸